

Vacina	História Vacinal	Esquema/ Dose Indicada	Idade Máxima Para Início Do Esquema	Local De Aplicação
<b>dTpa tipo adulto / Dupla adulto (dT)</b> (inativada) <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Difteria, Tétano (acidental, neonatal) e Coqueluche	Com 3 doses de Penta/DTP/ dT/dTpa	1 reforço de dTpa adulto, em cada gestação (20 <sup>a</sup> -36 <sup>a</sup> semanas)	a. A 2 <sup>a</sup> dose ou reforço, deve ser feita, preferencialmente, até 20 dias antes do parto <sup>1</sup> .  b. Agendar dose de reforço dTpa adulto, sempre que houver nova gestação	DE
	Com menos de 3 doses de Penta/ DTP/dT/dTpa	Completar o esquema com pelo menos 01 dose de dTpa adulto (20 <sup>a</sup> -36 <sup>a</sup> semanas) <sup>1</sup> e as demais doses com dT		
	Não vacinada	1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> doses com dT e 3 <sup>a</sup> dose com dTpa adulto (20 <sup>a</sup> -36 <sup>a</sup> semanas), quando captada precocemente		
		1 <sup>a</sup> dose de dTpa adulto (20 <sup>a</sup> -36 <sup>a</sup> semanas) e as demais com dT, quando captada mais tardiamente		
<b>Hepatite B (recombinante)</b> <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	-	-
	Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2 <sup>a</sup> ou 3 <sup>a</sup> dose	Sem limite de idade	DD
	Não vacinada	3 doses		

**Vacina Influenza:** está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde (criança, idoso, gestante, etc.)

**1. caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa adulto, aplicar puerpério o mais precoce possível.**